


SIECH
○○○○○

Vingt cavités ont été répertoriées sur ce massif de dimensions restreintes : 500m x 250m.

Incomplète est la topographie, car l'année pluvieuse que nous subissons nous a empêché de plus amples travaux dans les parties basses -siphonnantes- des galeries.

SITUATION :



HISTORIQUE

D'un accès facile, on peut présumer qu'elle est l'une des plus fréquentées de la région à l'heure actuelle. Toutefois nos anciens n'osaient s'aventurer dans des réseaux actifs. Les précurseurs de notre activité ont sûrement exploré la rivière mais certaines dates fantaisistes ne peuvent être prises en considération. La résurgence appelée la "Source" par les Sauratois, attirait par sa fraîcheur. Jamais d'angine, de maladie; mais un agneau rompit l'enchantement "E trouva un agnel crevat dins le riu d'Artigo..."

En Mars 1975, André Froment désobstrue un laminoir sableux et invente le nouveau réseau.

GEOLOGIE

La grotte de Siech est située au Nord du bassin de Tarascon sur Ariège dans des nombreuses écaillés dites de la forêt de l'Arse. Ces écaillés caractérisées par la superposition des calcaires Barrémo Bédouliens sur les dolomies jurassiques, sont pincées sous le massif primaire de l'Arize. La grotte s'ouvre dans les dolomies du Dogger et du Malm, se sont des dolomies noires et légèrement cristallines.

BIOLOGIE

Dans cette rivière souterraine on peut trouver la cohabitation de deux coléoptères de même genre. Il s'agit de *Spéonomus Pyrénéus* et de *Antrocharis Quérilhacé*. Notons au passage que pour des raisons que l'on ne peut encore affirmer (compétition nutritionnelle, température, qualité ou quantité de la nourriture) le *Spéonomus Pyrénéus* est dans cette cavité d'une taille nettement inférieure par rapport aux cavités proches où il ne se trouve pas en concurrence.

Nous avons également remarqué la présence de *Thyphloblaniulus*, *polydesmus* et *Opilion Scotolémon*.


De plus cette rivière souterraine fait parti des quelques cavités abritant l'*Euproctus Asper* en assez grande quantité. Rappelons que cette station a servi à Madame Clergue Gazeau pour l'établissement en 1966 de sa thèse sur ce sujet.

D'après Coiffait 1956, il a été énuméré la faune suivante : Coléoptères, Diptères, trichoptères, collemboles, araignées, diplopodes et vertébrés. Le Docteur Cauchois et J. Theodorides avaient cité dans siech *Spéonomus Pyrénéus Lerp* (notes Esp IX 1954 P.173). En fait suivant Coiffait, ce *Spéonomus* se rapproche de l'espèce *Aliéilli* (plantaurel) mais constitue une race très distincte la sous espèce *Bouillonni Coiff.*

DESCRIPTION

Ancien réseau

Empruntons la rivière qui conserve tout son attrait. Son couloir étroit, ses parois abruptes et surtout la docilité du niveau d'eau méritent une visite.



**RIVIERE SOUTERRAINE DE
SIECH**

Commune de SAURAT (Ariege)

X: 535,38

Y: 65,08

Ech: 0 5 10 m

Z: 676 m

Carte IGN FOIX 5-6 1/25000

TOPO: F BERGE . R GUINOT 1978

R1 672 m La "Source"

Siphon

LE SIECH